

Børneorm

Årsag

Børneorm skyldes infektion med en flercellet parasit (orm, helmint), som lever i tarmen hos mennesker

Forekomst

Børneorm findes i hele verden også i Danmark.

Smitteveje

Ormen lægger sine æg omkring endetarmens åbning om natten, og da det klør, får man æggene på fingrene, som kan føres til munden, eller findes på møbler og i husstøv, hvor de kan overføres til hænder og madvarer og dermed smitte videre. Æggene er meget modstandsdygtige og kan overleve i sengetøj og støv i et par uger.

Symptomer

Kløe i endetarmen mest udtalt om natten. Ormene kan let ses på afføringen. De er ca. 1 cm lange, hvide og sytrådslignende.

Behandling

Der findes medicin mod ormene (tabletter). Hele husstanden behandles samtidigt. Samtidig bør sengetøj og undertøj vaskes (minimum 60 grader).

Forholdsregler

God håndhygiejne og korte negle hos barnet.

Inkubationstid

2-6 uger, smitter fra 2 uger efter smitte til behandling er iværksat.

Ved konstatering af børneorm kan barnet atter modtages i pasning, når behandling er iværksat.

Kilder:

Statens Serum Institut, www.ssi.dk

Sundhedsstyrelsen. Smitsomme sygdomme hos Børn, Vejledning for daginstitutioner, skoler og forældre, 1996.

Den Kommunale Sundhedstjeneste 2010